



Măsuri recomandate

LA NIVELUL POPULAȚIEI GENERALE

1. Evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție

2. Menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului

3. Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință

4. Consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii, pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventuale investigații suplimentare

5. Consultarea centrelor de evaluare sau a centrelor de permanență organizate la nivel județean

6. Continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele aflate la risc: persoane cu vârsta peste 65 ani, gravide, bolnavii cronici



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Măsuri recomandate

LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI PREȘCOLARE

1. Realizarea triajului zilnic

2. Utilizarea măștii de protecție de către cadrele didactice și, eventual, de către copii

3. Informarea părinților și aparținătorilor legali privind semnele și simptomele de infecții respiratorii

4. Asigurarea materialelor necesare dezinfecției periodice a mâinilor și a suprafețelor

5. Aerisirea periodică a încăperilor

6. Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Măsuri recomandate

LA NIVELUL ANGAJATORILOR

1

Evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil

2

Utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată

3

Încurajarea vaccinării antigripale a personalului

4

Realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie



Măsuri recomandate

LA NIVELUL UNITĂȚILOR SANITARE

1.

Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personal, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor cu simptome respiratorii

2.

Purtarea echipamentului de protecție (măști, mănuși, halate) de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții

3.

Adaptarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, pe baza analizei de risc efectuate de către DSP

4.

Asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute

5.

Instituirea terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienții care prezintă simptome specifice gripei

6.

Continuarea vaccinării antigripale a personalului medico-sanitar și auxiliar

7.

Refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție, antiseptice și dezinfectante

8.

Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, al contactilor și al focarelor de îmbolnăvire